

Samtykke og information omkring sklerosering af karsprængninger på ben

Karsprængninger på ben

Synlige blodkar, karudvidelser og blodsprængninger – karsprængninger har mange navne. Årsagen til karsprængninger på benene er i de fleste tilfælde arveligt betinget. Derudover kan kvinder få dem på benene i forbindelse med graviditet – eller hvis man har åreknuder, eller som en følgevirkning efter en operation for åreknuder.

Sklerosering

Man injicerer en væske, Aethoxysclerol, og kan med en lille tynd nål ramme et helt forgrenet netværk. Medicinen virker ved at irritere og ætse blodkarrene indefra, så de ødelægges og går til grunde. Der kan forekomme en let svie og lidt kløe i forbindelse med behandlingen. Fra behandlingen og frem til ½ år efter, er forløbet meget forskelligt. Nogle oplever synlig effekt efter 14 dage, hos andre er de første 14 dage lidt frustrerende fordi det nu ser meget værre ud. Som regel er karsprængningerne væk efter 1 måneds tid, men man kan se sorte striber (størknet blod) eller brun pigmentering. Det er denne proces som kan variere i tid fra person til person. Man kan ikke forvente at de behandlede karsprængninger er 100% forsvundet efter én behandling. Erfaringer viser dog mange flotte resultater efter en behandling, men ofte skal der lige en eller to behandlinger mere til, for at få det sidste med.

Efter behandlingen

Efter behandlingen af karsprængninger må du ikke dyrke sport, yoga, pilates og lign. I det hele taget må du ikke få pulsen op en uge efter behandling. Ingen solbadning i en måned og derefter solfaktor 30 som minimum. Nogle studier tyder på at effekten bliver bedre hvis man anvender støttestrømper hele døgnet de første 4-6 dage efter behandlingen. Vælger du dette skal du medbringe strømperne på klinikken, da de skal på umiddelbart efter skleroseringen. Strømperne skal være lange, altså fra fod til op på låret, gerne uden tå. De kan købes hos Sahva, Matas eller på apoteket. Du kan de strømper vi anbefaler her på klinikken. Vi indkalder dig til en kontrol efter ca. 6 måneder. Denne kontrol er frivillig og selvfølgelig helt gratis for dig.

Komplikationer

Efter behandlingen kan der være lidt rødme og hævelse, dette forsvinder som regel efter et par dage. Såfremt vi behandler dig på anklerne, kan der være hævelse en uges tid efterfølgende. Der kan i sjældne tilfælde opstå et lille sår ved et af indstikstederne. I tilfælde af at det udvikler sig, kontakt da klinikken og vi vil vejlede dig over telefonen, og hvis relevant tilbyde dig et gratis tryghedsbesøg her i klinikken.

Samtykke og information

Jeg er informeret grundigt om behandlingen af karsprængninger med sklerosering. Jeg har hørt om forventet resultat og mulige komplikationer. Jeg er oplyst om betænkningstid på 48 timer, fra forundersøgelse til start af behandling. Jeg giver hermed mit informerede samtykke til at blive behandlet.

Dato: _____ **Navn:** _____ **Cpr.nr:** _____ .