

Information omkring sklerosering af karsprængninger på ben

Synlige blodkar, karudvidelser og blodsprængninger – karsprængninger har mange navne. Årsagen til karsprængninger på benene er i de fleste tilfælde arveligt betinget.

Sklerosering

Man injicerer en væske, Aethoxysclerol og kan med en lille tynd nål ramme et helt forgrenet netværk. Medicinen virker ved at irritere blodkarret, så det ødelægges og går til grunde. Der kan forekomme en let svie og lidt kløe i forbindelse med behandlingen. Fra behandlingen og fremtil ½ år efter er forløbet meget forskelligt. Nogle oplever synlig effekt efter 14 dage, hos andre er de første 14 dage lidt frustrerende fordi det nu ser meget værre ud. Som regel er karsprængningerne væk efter 1 måneds tid, men man kan se sorte striber (størknet blod) eller brunpigmentering. Det er denne proces som kan variere i tid fra person til person. Man kan ikke forvente at de behandlede karsprængninger er 100% forsvundet efter én behandling. Erfaringer viser dog mange flotte resultater efter en behandling, men ofte skal der lige en eller to behandlinger mere til, for at få det sidste med.

Bisidder

Du er velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med til forundersøgelsen.

Efter behandlingen

Efter behandlingen af karsprængninger må du ikke dyrke sport, yoga, pilates og lign. i en uge efter. Ingen solbadning i en måned og derefter solfaktor 30 som minimum. Nogle studier tyder på at effekten bliver bedre hvis man anvender støttestrømper hele døgnet de første 4-6 dage efter behandlingen. Vælger du dette, skal du medbringe strømperne på klinikken, da de skal på umiddelbart efter skleroseringen. Strømperne skal være lange, altså fra fod til op på låret, gerne uden tå. De kan købes hos Sahva, Matas eller på apoteket. Du kann købe de anbefalede strømper her på klinikken. Vi indkalder dig til en kontrol efter ca. 6 måneder. Denne kontrol er frivillig og gratis for dig.

Komplikationer

Der er en meget lille (sjældent) risiko for dannelse af et meget fint, forgrenet netværk af bittesmå kar i det behandlede område. Desuden kan der også opstå hyperpigmentering (brunfarve) ved indstikstederne og de behandlede kar. Disse bliver over tid lysere og lysere, for til sidst at forsvinde.

Information

Jeg har læst den skriftlige information om behandlingen af karsprængninger med sklerosering. Jeg har hørt om forventet resultat og mulige komplikationer. Jeg er oplyst om betænkningstid på 48 timer, fra mundtlig information ved forundersøgelse til start af behandling.

Dato: _____ **Navn:** _____ **Cpr.nr:** _____